

УТВЕРЖДЕНА

Приказом Председателя
РГУ «Комитет медицинского и
фармацевтического контроля
Министерства здравоохранения
Республики Казахстан»

от «__» _____ 2023г.

№ _____

Инструкция по медицинскому применению гомеопатического лекарственного препарата (Листок-вкладыш)

Торговое наименование

Дентокинд

Международное непатентованное название

Нет

Лекарственная форма, дозировка

Таблетки

Фармакотерапевтическая группа

Прочие препараты. Другие терапевтические препараты все. Другие лекарственные препараты.

Код АТХ V03AX

Показания к применению

Болезненные явления при прорезывании зубов, сопровождающиеся оталгией (болью в ушах), болезненной чувствительностью десен, лихорадкой и диареей.

Перечень сведений, необходимых до начала применения

Противопоказания

- гиперчувствительность к одному из активных веществ или к любому из вспомогательных веществ

Необходимые меры предосторожности при применении

В препарате содержится лактоза. Пациентам с редкими наследственными проблемами непереносимости галактозы, дефицитом лактазы или глюкозо-галактозной мальабсорбцией не следует принимать этот лекарственный препарат. При отсутствии улучшения, при отсутствии стабильной положительной динамики лечения или появлении новых симптомов

обратитесь к врачу, так как в таком случае может идти речь о заболевании, требующем врачебной помощи.

Требуется консультация врача, если возникают следующие симптомы:

- если ребенок плохо реагирует на Дентокинд,
- при возникновении дополнительных жалоб.

Взаимодействия с другими лекарственными препаратами

Не выявлено никаких взаимодействий с другими лекарственными препаратами. Применение данного гомеопатического лекарственного препарата не исключает применение других лекарственных средств.

Родителям рекомендуется проконсультироваться с врачом, если их ребенок принимает, недавно принимал или будет принимать какие-либо другие лекарственные средства.

Специальные предупреждения

Гомеопатическая терапия значительно отличается от традиционной медицины в отношении определения заболевания и применения лекарственных препаратов. Гомеопатические средства стимулируют собственные защитные механизмы организма и тем самым активизируют способность к самовосстановлению. Ответная реакция организма на гомеопатическое средство индивидуальна.

Имеющееся состояние может временно ухудшиться во время приема гомеопатических лекарственных средств (первоначальное гомеопатическое обострение). В таких случаях пациенты должны прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

Не следует применять лекарственное средство вместе с едой и напитками.

Применение в педиатрии

Применяется у детей грудного и дошкольного возраста

Во время беременности или лактации

Данный лекарственный препарат предназначен для детей.

Особенности влияния препарата на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами

Не влияет

Рекомендации по применению

Режим дозирования

Детям от 0 до 1 года:

- при острых симптомах по 1 таблетке через каждый час, но не более 6 таблеток в день;
- при улучшении состояния по 1 таблетке 3 раза в день.

Детям от 1 года до 6 лет:

- при острых симптомах по 2 таблетки через каждый час, но не более 12 таблеток в день;
- при улучшении состояния по 2 таблетки 3 раза в день.

Метод и путь введения

Пероральный.

Частота применения с указанием времени приема

Таблетки принимать за полчаса до или через полчаса после еды. Таблетки должны медленно раствориться во рту. При лечении грудных детей таблетки можно растворять в небольшом количестве воды. Максимальная суточная доза для детей до года - 6 таблеток в сутки, через каждый час. Максимальная суточная доза для детей от 1 года до 6 лет - 12 таблеток в сутки, через каждый час.

Длительность лечения

2-4 дня на каждое прорезывание зубов. В зависимости от индивидуального случая циклы лечения могут перекрываться или повторяться.

Меры, которые необходимо принять в случае передозировки

Случаев передозировки не зарегистрировано.

Меры, необходимые при пропуске одной или нескольких доз лекарственного препарата

Не давайте ребенку двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу.

Указание на наличие риска симптомов отмены

Никаких вредных последствий ожидать не приходится.

Рекомендации по обращению за консультацией к медицинскому работнику для разъяснения способа применения лекарственного препарата

Если Вы заподозрите, что у Вашего ребенка появляются признаки побочного эффекта после приема препарата Дентокинд, информируйте об этом вашего врача или фармацевта.

Описание нежелательных реакций, которые проявляются при стандартном применении ЛП и меры, которые следует принять в этом случае

Не давайте ребенку двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу.

При возникновении любых побочных реакций следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

При возникновении нежелательных лекарственных реакций обращаться к медицинскому работнику, фармацевтическому работнику или напрямую в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов РГП на ПХВ «Национальный Центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан <http://www.ndda.kz>

Дополнительные сведения

Состав лекарственного препарата

Одна таблетка (100 мг) содержит

<i>активные вещества:</i>	Атропа belladonna trit. D6	15.00 мг
	Matricaria recutita trit.D6	15.00 мг
	Ferrum phosphoricum trit.D6	15.00 мг
	Hepar sulfuris trit.D12	15.00 мг
	Pulsatilla pratensis trit.D6	15.00 мг,

вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, тальк, лактозы моногидрат, магния стеарат.

Описание внешнего вида, запаха, вкуса

Таблетки плоскоцилиндрической формы, белого или почти белого цвета, с фаской.

Форма выпуска и упаковка

По 150 таблеток во флаконе коричневого стекла с алюминиевым уплотнительным диском и пластиковой завинчивающейся крышкой. По 1 флакону вместе с инструкцией по медицинскому применению на казахском и русском языках вкладывают в пачку из картона.

Срок хранения

5 лет.

Не применять по истечении срока годности!

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте!

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Сведения о производителе

Др. Густав Кляйн ГмбХ & Ко. КГ

Штайненфельд 3,

77736 Целль ам Хармерсбах,

Германия

Телефон: +49 (0) 7835 63 55 10

Факс: +49 (0) 7835 634 685

E-mail: info@klein-naturarznei.de

Держатель регистрационного удостоверения

Альпен Фарма ГмбХ,

Штайненфельд 3

77736 Целль ам Хармерсбах

Германия

Тел.: +49 (0) 7243 200 49 20

E-mail: info.germany@alpenpharma.com

Наименование, адрес и контактные данные (телефон, факс, электронная почта) организации на территории Республики Казахстан, принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств от потребителей и ответственной за пострегистрационное наблюдение за безопасностью лекарственного средства

ТОО «Альпен Фарма»

Алматинская обл., Карасайский район, Елтайский сельский округ,

с.Кокузек, строение 1044

Тел./факс + 7 727 232 34 73,

+ 7 727 232 34 74

E-mail: info.kazakhstan@alpenpharma.com

Моб.тел. +7 701 035 70 69 ответственного лица за пострегистрационное наблюдение за безопасностью лекарственного средства.

E-mail: pv.kz@alpenpharma.com