

УТВЕРЖДЕНА

Приказом Председателя
РГУ «Комитет медицинского и
фармацевтического контроля
Министерства здравоохранения
Республики Казахстан»

от « ____ » _____ 20__ г.
№ _____

Инструкция по медицинскому применению Лекарственного препарата (Листок-вкладыш)

Торговое наименование

Солодкового корня сироп 125 г

Международное непатентованное название

Нет

Лекарственная форма, дозировка

Сироп

Фармакотерапевтическая группа

Респираторная система. Препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях. Экспекторанты, исключая комбинации с подавляющими кашель. Отхаркивающие препараты.

Код АТХ R05CA

Показания к применению

В составе комплексной терапии:

- острый бронхит
- хронический бронхит
- трахеит
- коклюш

Перечень сведений, необходимых до начала применения

Противопоказания

- гиперчувствительность к действующему веществу или к любому из вспомогательных веществ
- язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки
- гастрит

Взаимодействия с другими лекарственными препаратами

Не установлены

Специальные предупреждения

Применять с осторожностью и только по назначению врача больным сахарным диабетом, беременным и в период лактации, пациентам, страдающим алкоголизмом, заболеваниями печени.

Во время беременности или лактации

Противопоказано применение при беременности и в период грудного вскармливания.

Особенности влияния препарата на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами

Препарат не влияет на способность управлять транспортом или потенциально опасными механизмами.

Рекомендации по применению

Режим дозирования

Для приема внутрь.

Перед употреблением взбалтывать.

Сироп применяют внутрь 3 раза в день.

Взрослым 1 десертная ложка в 1/2 стакана воды на прием.

Дети.

Старше 12 лет - по 1 чайной ложке в 1/4 стакана воды на прием. От 2 до 12 лет- по 1/2 чайной ложке в 1/4 стакана воды на прием.

Длительность лечения

Курс лечения 5-7 дней.

Меры, которые необходимо принять в случае передозировки

Не выявлена

Описание нежелательных реакций, которые проявляются при стандартном применении ЛП и меры, которые следует принять в этом случае

- тошнота, рвота, изжога
- гипертензия
- периферические отеки
- кожная сыпь

При возникновении нежелательных лекарственных реакций обращаться к медицинскому работнику, фармацевтическому работнику или напрямую в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов

РГП на ПХВ «Национальный Центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан

<http://www.ndda.kz>

Дополнительные сведения

Состав лекарственного препарата

100 г сиропа содержит

активное вещество - солодки корней экстракт густой 4.0 г

вспомогательные вещества: сироп сахарный, этанол 90 %

Описание внешнего вида, запаха, вкуса

Густоватая жидкость бурого цвета, своеобразного запаха, сладкого вкуса.

Примечание. При хранении возможно выпадение осадка.

Форма выпуска и упаковка

По 125 г препарата во флаконы из стекломассы с винтовой горловиной, укупоренные полиэтиленовыми универсальными (алюминиевыми) крышками или пластмассовыми во флаконы из темно-коричневого непрозрачного поливинилхлорида, полиэтилентерефталата с винтовой горловиной вместимостью 100 мл, укупоренные крышками навинчиваемыми из полиэтилена высокой плотности или во флаконы из темно-розового непрозрачного поливинилхлорида, полиэтилентерефталата с винтовой горловиной вместимостью 125 мл, укупоренные навинчиваемыми крышками.

На флаконы наклеивают этикетки из бумаги этикеточной или писчей

Флаконы вместе с инструкциями по медицинскому применению на государственном и русском языках помещают в коробки из картона.

Флаконы без вторичной упаковки вместе с инструкциями по медицинскому применению на государственном и русском языках в соответствующем количестве укладывают в стопы из бумаги оберточной или в коробку из картона коробочного или пленку полиэтиленовую термоусадочную или ящики из гофрированного картона.

Срок хранения

3 года.

Не применять по истечении срока годности!

Условия хранения

Хранить в защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте!

Условия отпуска из аптек

Без рецепта

Сведения о производителе

ТОО «ТК Фарм Актобе», РК, Актыбинская обл., г. Актобе, р-н Астана, с. Шестихатка, ж.м. Шестихатка, зд. № 467.

Тел. 8 (7132) 21 72 15, [электронная почта: dir-tkpharm@mail.ru](mailto:dir-tkpharm@mail.ru)

Держатель регистрационного удостоверения

ТОО «ТК Фарм Актобе», РК, Актыбинская обл., г. Актобе, р-н Астана, с. Шестихатка, ж.м. Шестихатка, зд. № 467.

Тел. 8 (7132) 21 72 15, электронная почта: dir-tkpharm@mail.ru

Наименование, адрес и контактные данные (телефон, факс, электронная почта) организации на территории Республики Казахстан, принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств от потребителей и ответственной за пострегистрационное наблюдение за безопасностью лекарственного средства

ТОО «ТК Фарм Актобе», РК, Актюбинская обл., г. Актобе, р-н Астана,
с. Шестихатка, ж.м. Шестихатка, зд. № 467.

Тел. 8 (7132) 21 72 15, электронная почта: dir-tkpharm@mail.ru

